

GCS療法

切除不能進行・再発胆道癌

対象患者:PS 0-1

CDDP 25mg/m²

GEM 1000mg/m²

2W1クール



day 1

TS-1 80mg/m²/day 1日2回

休薬

〔 day 1 から7日間 〕

〔 day 8 から7日間 〕

NO	薬品名・規格	投与量	投与速度
1	イメンドカプセル125mg	経口(抗がん剤投与60-90分前)	
2	生食 500ml		60分
3	アロキシバッグ 0.75mg/50ml デキサート 9.9mg		15分
4	生食 100ml ゲムシタビン		30分
5	生食 500ml シスプラチン		60分
6	生食 500ml		60分

経口制吐剤:Day2-4

イメンドカプセル(80) 1カプセル 分1(朝) Day2-3

デカドロン錠(4mg) 2錠 分2(朝・昼) Day2-4

GEM 肝障害(T-Bil>1.6mg/dL)、腎障害(SCr>1.6mg/dL)がある場合は1段階減量(800mg/m²)をご考慮

CDDP 腎障害時は減量基準(46≤Ccr<60:25%減量、31≤Ccr<45:50%減量、Ccr<30:中止)を目安にご考慮下さい。

TS-1 腎機能障害時の減量目安(60≤Ccr<80:必要に応じて1段階減量、40≤Ccr<60:原則1段階減量、30≤Ccr<40:原則2段階減