

CAPOX(Capecitabine+L-OHP)+BV療法

切除不能な進行再発結腸・直腸癌

BV 7.5mg/kg

対象患者:PS 0-1

L-OHP 130mg/m²



Capecitabine 1,000mg/m²/回 1日2回

休薬

[day 1から14日間]

[day 15から7日間]

3W1クール

NO	薬品名・規格	投与量	投与速度
1	アロキシバッグ 0.75mg 50ml デキサート 9.9mg		15分
2	生食 100ml ベバシズマブ	mg	初回 90分 2回目 60分 3回目以降 30分
3	生食 50ml		15分
4	5%Tz 250ml エルプラット	mg	120分
5	生食 50mL		10分

Capecitabine腎機能障害時の減量目安(30≤Ccr<50:原則1段階減量(75%)、Ccr<30:投与禁忌)

体表面積	Capecitabine1回用量
BSA<1.36m ²	1,200mg(4錠)(2,400mg/日)
1.36m ² ≤BSA<1.66m ²	1,500mg(5錠)(3,000mg/日)
1.66m ² ≤BSA<1.96m ²	1,800mg(6錠)(3,600mg/日)
1.96m ² ≤BSA	2,100mg(7錠)(4,200mg/日)

★カペシタбинの副作用として手足症候群があります。GRADE2の症状が出た場合は休薬。GRADE3の症状やGrade2の症状が2回以上出る場合には休薬の上、減量をご検討ください。
★1クール毎に尿蛋白を検査項目に追加することをご考慮下さい。

経口制吐剤:Day2-3

デカドロン錠(4mg) 1錠 分1(朝) Day2-3