

TAS-102(FTD/TPI)+BV療法

切除不能な進行再発結腸・直腸癌

対象患者:PS 0-1

BV 5mg/kg



day1

BV 5mg/kg



day15

FTD/TPI 70mg/m ²	休	FTD/TPI 70mg/m ²	休	休薬
5日間内服	2	5日間内服	2	14日間休薬

※FTD/TPIは70mg/m²/日で、1日2回投与です。

4W1クール

NO	薬品名・規格	投与量	投与速度
1	アロキシバッグ 0.75mg 50ml デキサート 9.9mg		15分
2	生食100ml ベバシズマブ		mg
3	NS 50mL		15分

体表面積	TAS-102 1回用量
BSA<1.07m ²	35mg (70mg/日)
1.07m ² ≤BSA<1.23m ²	40mg (80mg/日)
1.23m ² ≤BSA<1.38m ²	45mg (90mg/日)
1.38m ² ≤BSA<1.53m ²	50mg (100mg/日)
1.53m ² ≤BSA<1.69m ²	55mg (110mg/日)
1.69m ² ≤BSA<1.84m ²	60mg (120mg/日)
1.84m ² ≤BSA<1.99m ²	65mg (130mg/日)
1.99m ² ≤BSA<2.15m ²	70mg (140mg/日)
2.15m ² ≤BSA	75mg (150mg/日)

☆1クール毎に尿蛋白を検査項目に追加することをご考慮下さい。