

HER+G-SOX(TS-1+L-OHP+HER)療法

HER2陽性切除不能進行・再発胃癌

対象患者:PS 0-1

HER 8mg/kg(初回)  
HER 6mg/kg(2回目)

L-OHP 130mg/m<sup>2</sup>



TS-1 80mg/m<sup>2</sup>/日 1日2回

休薬

〔 day 1から14日間 〕

〔 day 15から7日間 〕

3W1クール

NO	薬品名・規格	投与量	投与速度
1	生食 250ml	mg	初回 90分
	トラスツズマブ		2回目以降 30分
2	生食 50ml	mg	15分
3	アロキシバッグ 0.75mg 50ml デキサート 9.9mg		30分
4	5%Tz 250ml エルプラット	mg	120分
5	生食 50ml	mg	10分

☆心不全患者(LVEF<50)では心不全の悪化の可能性がある為、ハーセプチンの投与中止をご考慮下さい。原則として3ヶ月に1回、心エコー等によるLVEFの測定、評価を行ってください。

★腎機能低下患者ではTS-1の投与量の減量をご考慮下さい。

\*G-SOXでは血小板減少の遷延のリスクのある症例や高齢者ではL-OHPの投与量を100mg/m<sup>2</sup>で設定するレジメンもあります。

TS-1 腎機能障害時の減量目安 (60 ≤ Ccr < 80: 必要に応じて1段階減量、40 ≤ Ccr < 60: 原則1段階減量、30 ≤ Ccr < 40: 原則2段階減量)

**経口制吐剤: Day2-3**

デカドロン錠(4mg) 1錠 分1(朝) Day2-3